

Connaissances, attitudes et comportements à risque en matière d'IST/VIH Sida chez les professionnelles du sexe de trois zones touristiques d'Abidjan, Côte d'Ivoire

JB. ANDONABA¹, J. BÉNIÉ², I. TIEMBRÉ², Y. TRAORÉ², S. DAGNAN²,
J. TAGLIANTE-SARACINO²

Résumé

Les professionnelles du sexe (PS) constituent un des plus importants groupes qui contribuent à la propagation des IST/VIH-SIDA. Nous avons effectué une étude chez des PS de trois quartiers d'Abidjan en vue de déterminer leurs connaissances, leurs attitudes et comportements à risque en matière d'IST/VIH-SIDA. Il s'agit d'une étude transversale qui s'est déroulée de Janvier à Mars 2007. Un questionnaire a été administré à chaque PS. L'enquête a porté sur 78 PS dont 89,73 % étaient âgées de 19 à 34 ans et 51,28 % avaient un niveau secondaire. Dans 63,88 % des cas, les PS avaient eu leur premier rapport sexuel entre 15 et 17 ans. Les sources d'information étaient dominées par les médias (43,58 %). Les voies de transmission les plus citées étaient les rapports sexuels non protégés (64,10 %). Les PS ont affirmé qu'il n'existe pas de lien entre IST et VIH/SIDA (97,44 %). Quant aux comportements, 50 % ont eu des rapports sexuels non protégés ces 12 derniers mois, 63 % ont connu des ruptures de préservatif. En cas d'IST, le recours aux officines privées était privilégié. Ces PS présentaient des connaissances moyennes, mais les comportements à risque persistaient. Il importe d'intensifier la mise en œuvre de programmes spécifiques.

Mots clés : Connaissances, comportements à risque, IST/VIH-SIDA, Professionnelles du Sexe, Abidjan.

Knowledge, attitudes and risk behaviour on STI/HIV-AIDS of sex professional workers in three touristic areas in Abidjan, Côte d'Ivoire

Abstract

Sex professionals (SP) are one of the most important core-groups that contribute to the spread of STI/HIV-AIDS. A study was done among SP in three districts in the city of Abidjan to determine their knowledge, attitudes and risk behaviours on STI/HIV-AIDS. This cross-sectional study took place from January to March 2007 on the work place of SP. A questionnaire was proposed to SP after their consent. 78 SP were interviewed. Among them, 89.73 % were between 19 and 34 years of age and 51.28 % had attended secondary school. 63.88 % had had their first sexual intercourse between 15 and 17 years of age. 97.44 % of the interviewed knew about STI/HIV-AIDS. The top sources of information were the media (43.58 %). The most stated transmission ways were non-protected sexual intercourses (64.10 %). 85.90 % of SP asserted that there was no link between STI and HIV/AIDS. 50 % of SP had had non-protected sexual intercourse the

¹ INSSA (Institut Supérieur des Sciences de la Santé) Bobo-Dioulasso.

² UFR Sciences Médicales d'Abidjan.

last 12 months. 63 % of sex professionals experienced condom slide or break during sexual intercourse, 38.4 % undesired pregnancies. In case of STI, private officines were mostly used for care. These SP had average knowledge but risk behaviours persisted. Thus, further specific programmes must be implemented for these populations.

Keywords: Knowledge, risk behaviours, STI/HIV-AIDS, sex professionals, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Introduction

La pandémie du VIH reste le défi infectieux le plus grave en matière de santé publique. Selon l'ONU/SIDA, [ONU/SIDA, 2007], à la fin de l'année 2007, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde était estimé à 33,2 millions. L'Afrique subsaharienne demeure la région du monde la plus touchée par l'épidémie du VIH. Plus de deux tiers (68 %) de toutes les personnes infectées par le VIH vivent dans cette région où se sont produits plus de trois quarts (76 %) de tous les décès dus au sida en 2007. On estime que 1,7 million [1,4 million – 2,4 millions] de personnes ont été nouvellement infectées dans cette région. En Côte d'Ivoire, l'enquête démographique et de santé a estimé que la prévalence nationale du VIH chez les adultes était de 4,7 % (MS/CI, 2007). Ce taux classe la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus affectés par la pandémie dans la sous-région (Sénégal 0,7 %, Libéria 1,5 %, Mali 1,2 %, Bénin 1,5 %, Burkina Faso 1,6 %). L'examen des tendances mondiales et régionales laisse à penser que cette épidémie comporte deux grands schémas :

- des épidémies généralisées qui persistent au sein de la population générale de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, en particulier dans la partie australe du continent ;
- des épidémies affectant essentiellement les populations les plus exposées au risque d'infection, notamment des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les consommateurs de drogues injectables, les professionnels (les) du sexe et leurs partenaires sexuels.

Selon l'ONU/SIDA, [ONU/SIDA, 2003], les taux d'infection à VIH enregistrés chez les professionnels (les) du sexe et leurs clients sont nettement plus élevés. C'est souvent dans cette population que l'infection se propage d'abord avant de gagner la population générale. Cependant, force est de constater que face à ce groupe à risque avec ses différentes pratiques, bon nombre d'actions et d'interrogations méritent des réponses adéquates.

Cette étude visait principalement à étudier sur un échantillon de professionnelles du sexe, les connaissances, attitudes et comportements à risque en matière d'IST/VIH-SIDA.

Matériels et méthode

Notre étude a été menée à Abidjan (capitale économique de la Côte d'Ivoire) précisément dans les quartiers île Bouley (Commune de Yopougon), Vridi ako et Vridi canal (Commune de Port-Bouet). Il s'est agi d'une étude semi-qualitative transversale à visée descriptive qui s'est déroulée du 3 janvier au 15 février 2007, soit une durée de 45 jours. Celle-ci a consisté à effectuer des visites sur le terrain pour collecter les données sur les connaissances, les attitudes et les comportements à risque des professionnelles du sexe. La population cible était constituée de professionnelles du sexe de la zone de l'étude, rencontrées durant l'enquête. Il s'est agi d'un échantillonnage aléatoire. L'échantillon était constitué de 78 professionnelles du sexe âgées de 19 à 48 ans pour

lesquelles nous avons obtenu un consentement éclairé. Les quartiers ciblés sont situés à proximité des quais à bateaux et ont l'avantage d'accueillir de nombreux touristes étrangers et constituent de ce fait un pôle d'attraction des professionnelles du sexe. Notre zone d'étude est l'un des foyers où la profession du sexe est fortement pratiquée à Abidjan. Nous avons administré un questionnaire structuré aux professionnelles du sexe retenues pour l'enquête. Les données recueillies ont concerné leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs connaissances générales sur la sexualité et les IST/VIH-SIDA et enfin leurs attitudes et comportements à risque sexuelle. L'entretien avec les femmes s'est déroulé pour certaines sur le lieu du travail de 21 heures à minuit et pour les autres sur rendez-vous à leur domicile dès 8 heures du matin. La confidentialité et l'anonymat observé ont permis d'obtenir la confiance et l'adhésion totale des enquêtées ; ceci a permis d'avoir des entretiens ouverts et sereins dans l'ensemble. La fin de chaque entretien était marquée par un don de préservatifs.

Résultats

L'enquête a porté sur 78 professionnelles du sexe dont 89,73 % étaient âgées de 19 à 34 ans.

La tranche d'âge la plus représentée était celle comprise entre 25-34 ans, avec 58,97 % des effectifs. La répartition des enquêtées selon la situation matrimoniale montrait que 56,41 % vivaient en concubinage et que 38,46 % étaient célibataires (tableau I). Quant au niveau d'instruction, 51,28 % des enquêtées avaient un niveau primaire, 25,64 % un niveau secondaire et 14,10 % étaient analphabètes (Figure 1). Selon l'ancienneté de la pratique, 76,92 % des personnes interrogées avaient plus d'un an d'ancienneté, 23,07 % au moins un an et 11,55 % plus de 6 ans. La plupart, soit 97,44 % des enquêtées étaient informées de l'existence des IST/VIH-SIDA. À la question de savoir comment celles-ci recevaient les messages et informations sur les IST/VIH-SIDA, les médias (43,58 %) étaient cités comme la principale source d'information (figure 2). Les voies de transmission les plus citées étaient les rapports sexuels non protégés (64,10 %), la voie sanguine (25,4 %). Des voies de non transmission telles que les piqûres d'insectes et les toilettes étaient citées respectivement dans 26,92 % et 46,15 % (tableau II).

Tableau I. Répartition des professionnelles du sexe selon la situation matrimoniale.

Situation matrimoniale	Effectif	Pourcentage
Célibataire	30	38,46 %
Mariée	2	2,56 %
Concubinage	44	56,41 %
Veuve	2	2,56 %
Total	78	100,00 %




Figure 1. Répartition des enquêtées selon le niveau d'instruction.




Figure 2. Réponses des professionnelles du sexe relatives aux sources d'informations sur les IST/VIH-SIDA

Tableau II. Répartition des professionnelles du sexe selon leurs connaissances du mode de transmission des IST/VIH-SIDA.

Mode de transmission	Fréquence	Pourcentage
Toilette	36	46,15 %
Rapports sexuels non protégés	50	64,10 %
Le sang (objet souillé et transfusion)	20	25,24 %
Lingerie	21	26,92 %
Piqûre d'insecte	9	11,53 %
Geste quotidien de la vie (travailler, manger, jouer)	1	1,28 %
Lait maternel	2	2,56 %
Autres	7	8,97 %
Ne sait pas	11	14,10 %




Figure 3. Fréquence des recours des professionnelles du sexe en cas des IST.

Nous nous sommes intéressés à la connaissance par les professionnelles du sexe sur le lien entre les IST et la transmission du VIH : 85,90 % des professionnelles du sexe ont affirmé qu'il n'existe pas de lien entre les IST et le VIH. Parmi les recours thérapeutiques, 34,61 % des professionnelles du sexe avaient recours aux officines privées (figure 3). Les femmes avaient des com-

portements à risque : le préservatif féminin était utilisé par 15,38 % des professionnelles contre 84,61 % ; la moitié des professionnelles du sexe (50 %) ont eu des rapports sexuels non protégés ces 12 derniers mois, 63 % ont connu des situations de glissement ou de rupture du préservatif lors des rapports sexuels dans les 12 derniers mois et 38,4 % des grossesses non désirées. La majorité des enquêtées, soit 63,88 % avaient eu leur premier rapport sexuel entre 15 et 17 ans.

Discussion

De l'analyse des caractéristiques sociodémographiques, nous constatons que la majorité des professionnelles du sexe étaient âgées de 19 à 34 ans et que la moitié (56,41 %) vivait en concubinage. Elles avaient pour la plupart un niveau d'instruction acceptable allant du niveau primaire (25,64 %) au niveau secondaire (51,28 %) mais seulement 14,10 % étaient analphabètes. Environ un quart des professionnelles du sexe avait moins d'une année d'ancienneté. La première expérience sexuelle a eu lieu entre 15 et 17 ans chez 63,88 % d'entre elles corroborant les nombreuses études menées sur la précocité des rapports sexuels (TAMBASHE, 2001), (TANOI, 2004), (TOURE, 2003), (WINAVER, 2002). En effet, la réalité socio-économique de la Côte d'Ivoire pourrait exposer les adolescents à des comportements à risque tels que la toxicomanie et la prostitution (ENSEA, 1999), (KAPAMADZIJ, 2000). Plusieurs facteurs seraient incriminés ; ce sont entre autres la pauvreté, l'oisiveté, l'ignorance et la déscolarisation. De même, l'ignorance du risque, l'insouciance, le sentiment d'invulnérabilité et le désir de s'affirmer qui caractérisent cette période favorisent le changement perpétuel de partenaires sexuels et donc l'exposition aux risques de contamination par les IST notamment le VIH-SIDA (COURTOIS, 2001), (IMPACT, 2000). Concernant les connaissances des enquêtées sur les IST/VIH/SIDA, la majorité d'entre elles (97,44 %) était bien informée de l'existence des IST et du VIH/SIDA par plusieurs canaux notamment les médias et les campagnes de sensibilisation. Nos résultats concordent avec ceux rapportés par SICARD (SICARD, 1992) et KOKOUN (KOKOUN, 2002) qui trouvaient respectivement 92,2 % et 72 % de bon niveau de connaissance.

Cependant, malgré leurs connaissances sur l'existence des IST/VIH-SIDA, la majorité d'entre elles (85,90 %) a affirmé qu'il n'existe pas de lien entre les IST et le VIH. Cette méconnaissance pourrait justifier en partie la forte prévalence des IST. Des comportements à risque ont été constatés chez les enquêtées avec pour conséquence des grossesses non désirées pour certaines. Cela pourrait s'expliquer par la vulnérabilité naturelle, sociale et économique des jeunes filles depuis leur adolescence où elles font leurs premières expériences sexuelles et le désir du gain facile. Les grossesses non désirées avec déscolarisation ont également été observées dans l'étude de KONAN (KONAN, 2003). À ces comportements à risque vient s'ajouter le parcours de soins de ces professionnelles du sexe en cas de maladies ; ce parcours est marqué par une faible fréquentation d'établissements spécialisés dans la prise en charge des IST.

Conclusion

Les professionnelles du sexe auprès desquelles nous avons enquêté présentaient des connaissances moyennes sur les IST/VIH-SIDA. Nombreuses étaient celles qui avaient des comportements à risque, ce qui remet en cause la lutte contre la transmission des IST et le VIH exposant par conséquent, leurs clients à ces infections. Ainsi, vu la forte prévalence des IST/VIH-SIDA au sein de cette population, il importe d'accélérer la mise en œuvre de programmes spécifiques en faveur de ces groupes à haut risque d'infection.

Références bibliographiques

- COURTOIS R., MULLETE MALVY D., 2001.** Survey on sexual behaviour by Congolese and French high school students in an AIDS context. *Santé*, 11 (1) : 49-53.
- ENSEA, IDR, 1999.** Le recours à l'avortement : la situation en Côte d'Ivoire. *Etude et recherche*, 27, Abidjan, 3-53.
- IMPACT - USAID - SFPS., 2000.** Evaluation de l'effet de la campagne multimédia visant l'adoption des comportements à moindre risque en matière d'IST /VIH-SIDA chez les jeunes en Côte d'Ivoire, SFPS/RO volet recherche opérationnelle. Abidjan, 18 p.
- KAPAMADZIJ A., BJELICA A., SEGE DI D., 2000.** Sex knowledge and behaviour in male high school students. *Med. Preg./ 53(11-12)* : 595-9.
- MINISTERE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA DE COTE D'IVOIRE., 2007.** Enquête indicateurs du SIDA.
- KOKOUN K. E., 2002.** Appréciation des connaissances, des attitudes et pratiques des adolescents vis-à-vis de l'infection à VIH/SIDA en milieu scolaire, cas des établissements secondaires d'Abidjan. Thèse méd. Université d'Abidjan. N° 3036, 145 p
- KONAN Y., 2003.** Les comportements sexuels des adolescents en Côte d'Ivoire. *EDUCI, Cahier de Santé Publique* 2, 1, 37-44.
- ONU/SIDA., 2003.** Commerce du sexe et VIH/SIDA. Actualisation.
- ONU/SIDA., 2007.** Le point sur l'épidémie du SIDA
- SICARD JM., KANON S., QUADRAOGO LA., CHRIRON JP., 1992.** Evaluation du comportement sexuel et des connaissances sur le Sida en milieu scolaire au Burkina Faso. *Annales de la société belge de Médecine Tropicale*. 72 ; 1 ; 63-72.
- TAMBASHE B., AMOUZOU J., DJANGONE A., KASSENE S., 2001.** Sexualité, contraception, fécondité des adolescents en Côte d'Ivoire, projet régional SFPS, Abidjan, 32-43.
- TANOAH A., 2004.** Pratiques sexuelles des adolescents en milieu scolaire : cas du lycée classique d'Abidjan. Mémoire de C.E.S. de santé publique et de médecine communautaire, Abidjan, 1004, 75 p.
- TOURE B., 2003.** Profil des patients atteints d'infections sexuellement transmissibles au dispensaire antivénérien de l'INSP d'Abidjan. Thèse med. Université d'Abidjan, 3366, 129 p
- WINAVER D., 2002.** Sexe et sentiments. *Gynécol. Obst. Fertil.*, 30, 303-307.